

## 金英花 *Thryallis*; Rain-of-Gold

學名: *Galphimia glauca* Cav. 科名: 黃耨花科 *Malpighiaceae*

校園分布：舟山路生態池旁花圃、共同教室及農業綜合館間中庭花圃

形態特徵：

金英花，別名金虎尾、金英樹，原產於美國西部及墨西哥，為多年生常綠灌木，株高可達 1.8 公尺。莖為紅褐色。葉對生，鮮綠色，呈長卵形，質感細緻。花為總狀花序，頂生，花冠黃色，具花瓣及萼片各 5 枚。果實為漿果，呈橢圓形，長約 0.5-1 公分。金英花是一種耐旱且容易栽培的觀賞花卉，喜歡全日照、排水良好的沙質土壤及貧瘠土地。除了可以作為庭園、植生復育及公路綠化美化的植物外，金英花經常會出現在道路兩旁、受到擾動的土壤及火災燒過後的地方，它在受擾動過的土壤裏長的很好。由於花朵美麗和易於栽培，金英花被引種到其他地區作為觀賞植物，如澳洲、南非、智利及阿根廷，在澳洲及智利已經歸化成野生植物。



## 珊瑚藤 Coral Vine


學名: *Antigonon leptopus* Hook. & Arn.

科名: 蓼科 Family Polygonaceae

校園分布：生命科學館兩側停車棚

形態特徵：

珊瑚藤，別名紫苞藤、旭日藤、朝日蔓。蓼科，珊瑚藤屬，多年生半落葉蔓性藤本，原產墨西哥。高達 1-5 公尺，基部木質。莖由肥厚的塊根發出，長達 10 公尺，被棕褐色短柔毛，有稜和卷鬚。總狀花序，頂生或生於枝上部葉腋內，花序軸頂部延伸形成卷鬚；花序長達 30-40 公分，有多個分支，每小花簇有 3-5 朵花，花軸被短柔毛；花兩性，粉紅色或白色，具微香；花瓣不存在；苞片圓錐狀或心臟形，呈花瓣狀，5 裂，長 0.7-1 公分，不開展或僅部分開展，結果時稍增大並變為膜質而宿存。瘦果卵狀三角形，長約 1 公分，平滑，全部為增大具網紋的宿存苞片包圍；種子 1 顆，有富含澱粉的胚乳。花果期幾乎全年，夏至秋季最盛。



珊瑚藤

## 麥門冬 *Ophiopogon Radix*

學名: *Liriope spicata* (Thunb.) Lour. 科名: 假葉樹科 *Ruscaceae*

校園分布：

形態特徵：行政大樓周邊樹下花圃

麥門冬，又名麥冬、筧麥冬；假樹葉科，麥門冬屬。

多年生草本，莖短，具匍匐莖，塊根。葉基生無柄，長線形，長約 25- 45 cm，寬約 0.4- 0.8 mm，全緣或淺鋸齒，葉脈 7- 11 條，上表面為光澤油亮的深綠色，下表面覆有白粉而呈灰綠色，但兩面皆光滑無毛。總狀花序，長約 10 - 30 cm，花簇生，顏色淡紫或白，花被約長 0.5 - 0.6 cm，有花柄。果實內有 1- 4 顆圓形種子，種子大小直徑約 0.5- 0.7 cm，成熟時為黑色。

東南亞如越南、中國、台灣、日本以及韓國皆有分佈。台灣地區可見於中低海拔山區，潮濕涼爽的林下或草地間。

Ophiopogon Radix



## 白千層 *Cajeput-tree*、*Pune-tree*

學名: *Melaleuca leucadendra* L. 科名: 桃金娘科 *Myrtaceae*

校園分布：新生南路、舟山路旁、行政大樓周遭、校園零星分布

形態特徵：常綠喬木。葉互生，全緣，橢圓狀披針形或長橢圓形如柳葉（披針形），兩端均銳革質，具 3~7 縱走的平行脈。花白色或淡黃色，頂生，穗狀花序緊密排列似一支小瓶刷；蒴果杯狀或半球形，附著於老枝上。頂端成熟後 3 裂，種子細小，略呈線形。目前已知有 236 種，其中 230 種原產於澳洲，其餘生長在印度尼西亞、紐幾內亞、新喀里多尼亞和馬來西亞，為桃金娘科植物。在台灣被廣泛地栽植，是庭園綠蔭樹、行道樹或防風樹。

